

**Informovaný souhlas pacienta s operačním výkonem**

**- zavedením pásky pod močovou trubici**

**Jméno a příjmení pacientky:**

**Rodné číslo :**

Název výkonu: Zavedení pásky pod močovou trubici (suburetrální páska transobturatorní)

Operátor: MUDr. David Neubert, Ph.D.

Předpokládaný prospěch výkonu:

Úprava nežádoucího úniku moči při zvýšení nitrobršního tlaku - tedy obvykle při smíchu, kýchání a kašli, sportování či jiné fyzické aktivitě.

Popis výkonu:

Výkon se provádí v celkové anestezii. Doba trvání výkonu je obvykle cca. 15 - 20 minut. Během výkonu ležíte v tzv. gynekologické poloze (tedy na zádech s pokrčenýma nohama v kyčlích a kolenou). Uvnitř pochvy se nejprve provede krátký řez v délce asi 2cm, kudy se pak pod močovou trubici speciálními zavaděči umístí páska. V tříslech se poté na každé straně provede jeden drobný vpich (cca. 5 mm), který slouží pro umístění a upevnění pásky. Jizva v pochvě se sešije vstřebatelnými stehy. Drobné vpichy v tříslech se obvykle pouze přelepí (tzv. tlakové krytí).

Po výkonu:

Probudíte se již na zákrovém sále, odkud budete odvezena zpět na Váš pokoj. Tam Vás bude sledovat náš vyškolený personál. Při prvním vstávání z lůžka Vás bude doprovázet naše sestra. V následujícím období budeme kontrolovat, zda samovolně močíte a jste schopna důkladně vyprázdnit močový měchýř. Pokud budete močit bez obtíží, je možné Vás propustit do domácí péče. To je možné cca. za 2 hodiny po výkonu a vždy v doprovodu, který jste si předem domluvili.

**Možná rizika a komplikace výkonu:**

- \* Žádný lékař Vám nemůže zaručit stoprocentní výsledek operace. Je naším přáním, aby Vaše operace proběhla bez komplikací. Ale i přes pečlivou operační techniku může dojít ke komplikacím.
- \* Bezprostředně po výkonu se může stát, že nebudete schopna při samovolném močení zcela vyprázdnit močový měchýř. Jedná se o dočasný jev, který je způsobený otokem močové trubice. Obvykle vymizí samovolně během několika dnů. Pokud je potřeba, řeší se cévkováním.
- \* Některé ženy po výkonu popisují tzv. jiný dojem z močení, kdy samotné močení trvá o něco déle než dříve.
- \* Bolesti v tříslech. Nejčastěji ustoupí během 3-7 dnů. Někdy nepříjemný pocit v tříslech může přetrvávat i déle.
- \* Pooperační zánět močového měchýře – obvykle se snadno vyřeší podáním citlivých léků.
- \* V ojedinělých případech může dojít k poranění močového měchýře či ke krvácení (z operační rány v pochvě).
- \* Komplikace mohou vzniknout i při podání anestezie. Více informací Vám sdělí lékař – anesteziolog před výkonem.

**CO DODRŽOVAT DOMA PO PROPUŠTĚNÍ?**

- \* I nadále sledovat, zda samovolně a bez problémů močíte, močení může být pomalejší (viz. výše)
- \* Nekoupat se, jen sprchovat.
- \* Do pochvy nezavádět tampony ani vaginální globule. Používat pouze menstruační vložky. (**Stehy v pochvě se samy odloučí a jizva se bude hojit tzv. výtokem, který může zapáchat či být lehce zabarven krví.** **Upozorňujeme, že drobné krvácení (špinění) můžete pozorovat klidně i 14 dnů po výkonu.**)
- \* Nezvedat těžká břemena, nevykonávat fyzicky namáhavou práci, omezit sportovní aktivity, absence pohlavního styku po dobu 4 týdnů po výkonu.

Pokud lékař nedoporučí jiný postup, **kontrola** v NEUMED gynekologické ambulanci je za **měsíc od operace**, prosíme o telefonické objednání.

Pokud budete mít jakékoli potíže, je Vám po **dobu 24 hodin od zákroku** k dispozici naše **horká linka 605 155 758**, později pak můžete volat kdykoli během ordinačních hodin.

**SOUHLAS:** \_\_\_\_\_ zakroužkujte správnou odpověď

Byla jsem srozumitelně informována o výkonu, jeho účelu, očekávaném efektu, rizicích a možných komplikacích. ANO NE

Byla jsem informována o léčebném režimu a o opatřeních po výkonu. ANO NE

Všem těmto vysvětlením a informacím, které mi byly lékařem sděleny a vysvětleny, NE ANO

jsem porozumněla. Zároveň jsem měla možnost klást doplňující otázky, které mi byly zodpovězeny.

-----  
podpis pacientky

-----  
MUDr. David Neubert, Ph.D.

-----  
datum

-----  
hodina