

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY SE ZAVEDENÍM NITRODĚLOŽNÍHO TĚLÍSKA - HORMONÁLNÍ TYP

Jméno:

RČ:.....

žádám o zavedení nitroděložního tělíska :

HORMONÁLNÍ , typ :

Vážená paní, slečno,

rozhodla jste se pro **zavedení nitroděložního tělíska (dále IUD)**, jako prostředku ochrany před početím.

Mechanismus antikoncepčního **účinku** je takový, že v dutině děložní tělísko vyvolává stav, který je nepříznivý pro uhnízdění vajíčka. Je narušen pohyb spermií i transport vajíčka a snižuje se schopnost spermií oplodnit vajíčko. Vámi zvolené tělísko obsahuje navíc hormon – gestagen, který je postupně, každý den, ve velmi malém množství uvolňován. Ten působí v děloze, kde jednak zamezuje otěhotnění a též příznivě ovlivňuje děložní výstelku (endometrium) - snížení délky a intenzity menstruačního krvácení. Tento hormon dále ovlivňuje hustotu hlenu děložního hrdla, čímž zabráňuje vstupu spermií do dělohy a tím oplodnění vajíčka.

Aplikace:

IUD se zavádí pomocí přiloženého originálního zavaděče, obvykle ambulantně, zavedení může být nepříjemné, nemělo by být bolestivé. Tělísko by mělo být zaváděno během nebo krátce po menses. Po předchozí domluvě je možné zavedení provést v krátké analgosedaci (ve FN Olomouc či IVF Clinic a.s.).

Možné komplikace a rizika spojená se zavedením či extrakcí IUD:

- * V ojedinělých případech může dojít při obtížném zavádění tělíska k poranění děložní stěny.
- * Po zavedení se mohou objevit přechodně bolesti v podbřišku, nepravidelné krvácení či špinění mimo cyklus.
- * V některých případech může přechodně dojít k prodloužení či zesílení menstruačního krvácení.
- * Tělísko může též z dutiny děložní vycestovat a to buď úplně (zcela "vypadne") či jen částečně do hrdla děložního. Z těchto důvodů provádíme cca za měsíc po zavedení (po menstruaci) ultrazvukovou kontrolu uložení tělíska.
- * I při zavedeném nitroděložním tělísku může vzniknout těhotenství (nitroděložní nebo mimoděložní). Proto při první absenci menses je nutné provést těhotenský test nebo navštívit gynekologa.
- * Zánět dělohy, vejcovodů, vaječníků.

Nevhodné je užití IUD v následujících případech:

zhoubné onemocnění děložního hrdla nebo těla, těhotenství (tělíško by mělo být zaváděno během nebo krátce po menses), infekce pohlavních orgánů včetně pohlavních chorob, získaná choroba či vrozená anomálie, která deformuje dutinu děložní, abnormální děložní krvácení, mimoděložní těhotenství v anamnéze, některé další stavy a choroby (alergie na měď, Wilsonova choroba u tělíška s mědí).

Tělíško se ve většině případů odstraňuje ambulantně. V případě komplikací, jako je jeho rozlomení či zadržení v děloze, následuje obvykle odstranění v krátké narkóze.

Tělíško je možné ponechat v dutině děložní nejdéle po dobu 6-ti let, resp. 3 let – Jaydess. Po překročení této doby výrazně stoupá riziko zánětlivých komplikací včetně nebezpečné aktinomykózy. Na přání pacientky či v případě jakýchkoli komplikací je možné tělíško odstranit kdykoli.

Naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, na všechno co Vás ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá.

Ujistíme Vás, že učiníme vše pro to, aby zákrok proběhl bez komplikací.

Prohlašuji, že mi byl náležitě a srozumitelně objasněn princip provedení výkonu a byla jsem seznámena s možnými komplikacemi. Informacím rozumím a současně jsem měla možnost klást otázky a získat na ně přiměřenou odpověď.

Souhlasím se zavedením nitroděložního tělíška.

.....
podpis pacientky

V Olomouci, dnev.....hod.

.....
MUDr.David Neubert, Ph.D.

jméno a podpis lékaře